

# ESSEC

## Mathématiques I

Mathématiques approfondies

Sujet adapté – 2005

---

### Table des matières

---

|          |                                                                                       |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Partie I</b>                                                                       | <b>2</b> |
|          | <i>Thèmes abordés : fonctions d'une variable. . . . .</i>                             | 2        |
| <b>2</b> | <b>Partie II</b>                                                                      | <b>3</b> |
|          | <i>Thèmes abordés : algèbre bilinéaire ; réduction. . . . .</i>                       | 3        |
| <b>3</b> | <b>Partie III</b>                                                                     | <b>4</b> |
|          | <i>Thèmes abordés : applications linéaires ; algèbre bilinéaire ; suites. . . . .</i> | 4        |

Les parties du sujet contenant des éléments n'étant plus au programme depuis 2022 ont été adaptées pour convenir aux nouveaux programmes de la filière Mathématiques approfondies en vigueur depuis 2023.

## Notations

Dans tout ce problème, on considère  $n$  un entier naturel non nul. Pour toute matrice  $M$ , on note  ${}^tM$  sa transposée.

On identifie l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^n$ , muni de sa base canonique, à l'ensemble des matrices colonnes à  $n$  lignes; ainsi, pour tout vecteur  $x$  de  $\mathbb{R}^n$  et pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ , on note  $x_i$  sa  $i$ -ème coordonnée et

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

On munit  $\mathbb{R}^n$  de son produit scalaire canonique :  $\langle x, y \rangle = {}^txy$ , et la norme euclidienne de  $x$  est définie par  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ .

On désigne par  $U$  une partie non vide de  $\mathbb{R}^n$ . À toute fonction continue  $f$  de  $U$  dans  $\mathbb{R}$ , et à tout vecteur  $y$  de  $\mathbb{R}^n$ , on associe la fonction  $F_y$  définie sur  $U$  par

$$x \longmapsto \langle x, y \rangle - f(x),$$

et on note  $U(f)$  l'ensemble, éventuellement vide, des vecteurs  $y$  de  $\mathbb{R}^n$  pour lesquels  $F_y$  admet un maximum.

Lorsque  $U(f)$  est non vide, on appelle fonction conjuguée de  $f$  la fonction notée  $f^*$  définie sur  $U(f)$  par

$$f^*(y) = \max\{F_y(x) \mid x \in U\}.$$

## 1 Partie I

*Thèmes abordés : fonctions d'une variable.*

Dans cette partie,  $n = 1$  et  $U$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ ; ainsi le produit scalaire se confond avec le produit naturel sur  $\mathbb{R}$  et la fonction  $F_y$  est définie sur l'intervalle  $U$  par  $F_y(x) = xy - f(x)$ .

1. Lorsque  $U$  est un segment de  $\mathbb{R}$ , montrer que  $f^*$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .
2. **Quelques exemples.** Après avoir étudié les variations de  $F_y$ , préciser  $U(f)$  et  $f^*$  dans les cas suivants :
  - a)  $U = \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{ax^2}{2}$  où  $a$  est un réel fixé strictement positif.
  - b)  $U = \mathbb{R}_+^*$ ,  $f(x) = \frac{x^\alpha}{\alpha}$  où  $\alpha$  est un réel fixé strictement supérieur à 1. On pourra introduire le réel  $\beta$  vérifiant  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$ .
  - c)  $U = \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^x$ .
3. Pour chacun des cas précédents, déterminer  $(f^*)^*$  ainsi que son ensemble de définition. Quel constat pouvez-vous faire ?
4. Plus généralement, on suppose que  $U = \mathbb{R}$  et  $f$  est une application de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}$  telle que l'image de  $\mathbb{R}$  par la fonction dérivée est  $\mathbb{R}$  tout entier et vérifiant, pour tout réel  $x$ ,  $f''(x) > 0$ .

- a) Établir que  $f'$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ . On note  $g$  l'application réciproque de  $f'$ .  
 b) Après avoir dressé le tableau des variations de l'application  $F_y$  associée à  $f$  et  $y$ , montrer que  $U(f) = \mathbb{R}$  et que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^*(x) = xg(x) - f(g(x)).$$

Justifier la dérivabilité de  $f^*$  et exprimer  $(f^*)'$  en fonction de  $g$ .

- c) Après avoir étudié, pour  $y$  réel, les variations de l'application  $x \mapsto xy - f^*(x)$ , en déduire que  $(f^*)^* = f$ .

## 2 Partie II

*Thèmes abordés : algèbre bilinéaire ; réduction.*

On revient aux notations du préambule.

- On suppose dans cette question que  $U = \mathbb{R}^n$  et  $f(x) = \|x\|$ .
  - Pour  $t$  réel strictement positif et  $y \in \mathbb{R}^n$ , calculer  $F_y(ty)$  et préciser  $\lim_{t \rightarrow +\infty} F_y(ty)$ . Quelle comparaison pouvez-vous faire entre les ensembles  $U(f)$  et  $\{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y\| \leq 1\}$  ?
  - Lorsque  $\|y\| \leq 1$ , montrer que  $F_y(x) \leq F_y(0)$ . En déduire  $U(f)$  et  $f^*$ .
  - Préciser  $(f^*)^*$ .

Dans toute la suite du problème,  $A$  désigne une matrice symétrique réelle d'ordre  $n$  dont toutes les valeurs propres sont strictement positives. On rappelle que

$$\forall x, x' \in \mathbb{R}^n, \quad \langle x, Ax' \rangle = \langle x', Ax \rangle.$$

- On suppose dans cette question que  $U = \mathbb{R}^n$  et  $f(x) = \frac{\langle x, Ax \rangle}{2}$ . Pour  $y \in \mathbb{R}^n$ , on définit ainsi  $F_y$  sur  $\mathbb{R}^n$  par  $F_y(x) = \langle x, y \rangle - \frac{\langle x, Ax \rangle}{2}$ .

- En utilisant un changement de base orthonormale, établir l'encadrement

$$\lambda \|x\|^2 \leq \langle x, Ax \rangle \leq \mu \|x\|^2,$$

lorsque  $\lambda$  (respectivement  $\mu$ ) désigne la plus petite (respectivement la plus grande) valeur propre de  $A$ .

- Pour  $x$  et  $h$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ , exprimer  $F_y(x+h) - F_y(x)$  en fonction de  $\langle h, Ah \rangle$  et  $\langle h, y - Ax \rangle$ , et établir que  $F_y(x+h) - F_y(x) \leq \langle h, y - Ax \rangle$ .
  - Montrer que, pour tout vecteur  $y$  de  $\mathbb{R}^n$ ,  $F_y$  admet un maximum obtenu pour  $x = A^{-1}y$ , et préciser  $U(f)$ ,  $f^*$  et  $(f^*)^*$ .
- On reprend la même fonction qu'à la question 2), c'est-à-dire  $f(x) = \frac{\langle x, Ax \rangle}{2}$ , mais dans cette question, on suppose que  $U$  est une partie convexe, fermée non vide de  $\mathbb{R}^n$ . On prolonge, de façon naturelle et pour tout  $y \in \mathbb{R}^n$ ,  $F_y$  à  $\mathbb{R}^n$  en posant

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad F_y(x) = \langle x, y \rangle - \frac{\langle x, Ax \rangle}{2}.$$

- Existence d'un maximum.**

- Montrer que, pour tout  $y \in \mathbb{R}^n$ ,  $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} F_y(x) = -\infty$ ; en déduire que, pour  $x_0 \in U$ , il existe  $r$  strictement positif vérifiant  $(\|x\| > r \Rightarrow F_y(x) < F_y(x_0))$ .
- Établir que l'ensemble  $U_0 = U \cap \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq r\}$  est une partie fermée et bornée de  $\mathbb{R}^n$ , et en déduire que  $U(f) = \mathbb{R}^n$ .

b) **Unicité d'un élément réalisant le maximum.**

- Pour  $x$  et  $x'$  deux vecteurs de  $U$  et  $y \in \mathbb{R}^n$ , établir la relation

$$F_y\left(\frac{x+x'}{2}\right) - \frac{F_y(x)}{2} - \frac{F_y(x')}{2} = \frac{\langle x-x', A(x-x') \rangle}{8}.$$

- En supposant que  $\bar{x}$  et  $\bar{x}'$  sont deux vecteurs distincts réalisant le maximum de  $F_y$ , montrer que  $f^*(y) < F_y\left(\frac{1}{2}(\bar{x} + \bar{x}')\right)$  puis établir une contradiction.

### 3 Partie III

*Thèmes abordés : applications linéaires ; algèbre bilinéaire ; suites.*

Dans toute cette partie,  $c$  désigne un vecteur de  $\mathbb{R}^n$  et  $B$  une matrice carrée non nulle à  $n$  lignes et  $n$  colonnes.

On reprend la même fonction et les mêmes conventions qu'en II.3) et on choisit pour  $U$  l'ensemble des vecteurs  $x$  de  $\mathbb{R}^n$  vérifiant  $Bx = c$ . On note  $\text{Im } M$  et  $\text{Ker } M$  l'image et le noyau de l'endomorphisme canoniquement associé à une matrice carrée  $M$  d'ordre  $n$ .

On suppose que  $c \in \text{Im } B$ ; ainsi  $U$  est une partie convexe fermée non vide de  $\mathbb{R}^n$  (on ne demande pas de le vérifier). D'après les résultats obtenus dans la partie II, on sait que pour tout  $y \in \mathbb{R}^n$ ,  $F_y$  admet un unique vecteur  $\bar{x}$  appartenant à  $U$  et réalisant le maximum de  $F_y$ . L'objectif de cette partie est de donner une caractérisation de  $\bar{x}$  et d'établir un algorithme de recherche.

1. **Caractérisation de  $\bar{x}$ .**

- a) Vérifier que pour tout  $x, x'$  de  $\mathbb{R}^n$ ,  $\langle x, Bx' \rangle = \langle {}^t Bx, x' \rangle$ . Montrer que  $\text{Im } {}^t B \subset (\text{Ker } B)^\perp$ , en désignant par  $(\text{Ker } B)^\perp$  l'orthogonal de la partie  $\text{Ker } B$ . Justifier l'égalité des dimensions de  $\text{Im } {}^t B$  et de  $(\text{Ker } B)^\perp$  et en déduire que

$$\text{Im } {}^t B = (\text{Ker } B)^\perp.$$

On admettra que  $\text{rg}(B) = \text{rg}({}^t B)$ .

- b) Lorsque  $h$  est un vecteur de  $\text{Ker } B$  et  $t$  un réel, établir la relation

$$F_y(\bar{x} + th) - F_y(\bar{x}) = t\langle y - A\bar{x}, h \rangle - t^2 \frac{\langle h, Ah \rangle}{2}.$$

En déduire que  $\bar{x}$  est caractérisé par l'existence de  $\bar{z} \in \mathbb{R}^n$  vérifiant les deux conditions  $B\bar{x} = c$  et  $A\bar{x} = {}^t B\bar{z}$ .

2. **Un algorithme de recherche de  $\bar{x}$ .**

On désigne par  $r$  un réel strictement positif et  $z_0$  un vecteur de  $\mathbb{R}^n$  et on définit les suites  $(z_p)_{p \in \mathbb{N}}$  et  $(x_p)_{p \in \mathbb{N}}$  de  $\mathbb{R}^n$  par

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad Ax_p - y + {}^t Bz_p = 0 \quad \text{et} \quad z_{p+1} = z_p + r(Bx_p - c).$$

- a) Montrer que les deux suites sont bien définies et qu'elles vérifient les deux relations

$$A(x_p - \bar{x}) = {}^t B(\bar{z} - z_p) \quad \text{et} \quad z_{p+1} - \bar{z} = z_p - \bar{z} + rB(x_p - \bar{x}).$$

- b) Montrer que

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \|z_{p+1} - \bar{z}\|^2 = \|z_p - \bar{z}\|^2 - 2r\langle x_p - \bar{x}, A(x_p - \bar{x}) \rangle + r^2 \|B(x_p - \bar{x})\|^2.$$

- c) Démontrer l'existence d'une matrice carrée d'ordre  $n$  symétrique à valeurs propres strictement positives notée  $A^{1/2}$  et vérifiant  $(A^{1/2})^2 = A$ . On note  $A^{-1/2}$  la matrice inverse de  $A^{1/2}$ .

- Montrer la relation  $\|BA^{-1/2}x\|^2 = \langle x, A^{-1/2t}BBA^{-1/2}x \rangle$  pour tout  $x$  de  $\mathbb{R}^n$ .
- Établir que la matrice  $A^{-1/2t}BBA^{-1/2}$  est symétrique et que sa plus grande valeur propre  $\alpha$  est strictement positive.
- En déduire que pour tout  $x$  de  $\mathbb{R}^n$ , on a  $\|Bx\|^2 \leq \alpha \langle x, Ax \rangle$ .

- d) On choisit  $r \in \left]0, \frac{2}{\alpha}\right[$ . Montrer que

$$\|z_{p+1} - \bar{z}\|^2 - \|z_p - \bar{z}\|^2 \leq r(r\alpha - 2)\langle x_p - \bar{x}, A(x_p - \bar{x}) \rangle \leq 0.$$

En déduire que la suite  $(\|z_p - \bar{z}\|)_{p \in \mathbb{N}}$  est monotone convergente, puis que  $x_p$  converge vers  $\bar{x}$ .