

Année : 2013

École : EDHEC

Option : Mathématiques approfondies

Les parties du sujet contenant des éléments n'étant plus au programme depuis 2022 ont été adaptées pour convenir aux nouveaux programmes de la filière Mathématiques approfondies en vigueur depuis 2023.

Sommaire

Exercice 1	1
<i>Thèmes abordés : suites ; séries ; Python</i>	1
Exercice 2	2
<i>Thèmes abordés : espaces vectoriels ; réduction ; applications linéaires ;</i>	
<i>algèbre bilinéaire</i>	2
Exercice 3	3
<i>Thèmes abordés : variables à densité ; convergences de variables</i>	3
Problème	5
<i>Thèmes abordés : intégrales ; intégrales généralisées ; suites ; séries ;</i>	
<i>Probabilité discrètes</i>	5

Consignes

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Les candidats sont invités à encadrer, dans la mesure du possible, les résultats de leurs calculs. Ils ne doivent faire usage d'aucun document. Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

Exercice 1

Thèmes abordés : suites ; séries ; Python.

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels strictement positifs telle que la série de terme général $\frac{1}{a_n}$ converge.

Le but de cet exercice est de prouver que la série de terme général

$$u_n = \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$$

converge également et que, de plus,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n \leq 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n}.$$

- 1) Étude d'un exemple : pour tout entier naturel n non nul, on pose $a_n = n(n+1)$.
 - a) Vérifier que $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, puis en déduire que la série de terme général $\frac{1}{a_n}$ converge et donner sa somme.
 - b) Pour tout entier naturel n non nul, déterminer u_n en fonction de n .
 - c) Établir la convergence de la série de terme général u_n et donner sa somme, puis en déduire l'inégalité demandée.
- 2) Étude d'un deuxième exemple. On suppose, dans cette question, que, pour tout entier naturel n non nul, on a $a_n = n!$.
 - a) Écrire en Python une fonction `fact(n)` qui prend en argument un entier naturel n et renvoie $n!$.
 - b) Écrire un programme Python utilisant cette fonction et permettant de calculer et d'afficher la valeur de u_n , lorsque la valeur de n est entrée au clavier par l'utilisateur.
 - c) Établir la convergence de la série de terme général $\frac{1}{a_n}$.
 - d) Montrer que, pour tout entier naturel n non nul,

$$u_n \leq \frac{1}{(n-1)!}.$$

- e) En déduire que la série de terme général u_n converge et que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n \leq 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n}.$$

On revient au cas général.

3) Montrer, grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad (1 + 2 + \cdots + n)^2 \leq (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{4}{a_2} + \cdots + \frac{n^2}{a_n} \right).$$

4) a) Utiliser le résultat précédent pour établir que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{2n+1}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \leq 4 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k}.$$

b) En déduire, par sommation, que

$$\forall N \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{n=1}^N \frac{2n+1}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \leq 4 \sum_{k=1}^N \frac{1}{a_k}.$$

c) Montrer enfin que la série de terme général $\frac{2n+1}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$ converge, puis établir le résultat demandé.

Exercice 2

Thèmes abordés : espaces vectoriels ; réduction ; applications linéaires ; algèbre bilinéaire.

Dans tout l'exercice, n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2. On désigne par E un espace vectoriel de dimension n et on rappelle qu'un hyperplan de E est un sous-espace vectoriel de E de dimension $n-1$. Pour finir, on désigne par Id l'endomorphisme identité de E .

1) Étude d'un premier exemple ($n=3$ et $E=\mathbb{R}^3$).

On considère, dans cette question seulement, l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que $\text{Im } f$ est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$ et qu'il est stable par f .

2) Étude d'un deuxième exemple ($n=3$ et $E=\mathbb{R}^3$).

On considère, dans cette question seulement, l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) Déterminer les valeurs propres de f .

b) Montrer que $\ker(f - \text{Id})$ est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$ et qu'il est stable par f .

On suppose dans la suite que E est un espace euclidien de dimension n et on note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E . Le produit scalaire des vecteurs x et y de E est noté $\langle x, y \rangle$ et la norme de x est notée $\|x\|$.

On considère un endomorphisme f de E qui possède au moins une valeur propre λ réelle et on se propose de démontrer qu'il existe un hyperplan de E stable par f .

- 3) On note f^* l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est la transposée de la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.

a) Vérifier que l'on a

$$\forall (x, y) \in E \times E, \quad \langle f(x), y \rangle = \langle x, f^*(y) \rangle.$$

b) Établir que f^* est l'unique endomorphisme de E vérifiant la relation précédente.

- 4) a) Montrer que λ est valeur propre de f^* .

b) On considère un vecteur propre u de f^* associé à la valeur propre λ . Montrer que $(\text{Vect}(u))^\perp$ est un hyperplan de E et qu'il est stable par f .

Exercice 3

Thèmes abordés : variables à densité ; convergences de variables.

- 1) On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x^2}, & \text{si } x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f peut être considérée comme une fonction densité de probabilité.

Dans la suite, on considère une suite $(X_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires, toutes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, mutuellement indépendantes et admettant toutes f comme densité.

De plus, pour tout entier naturel n non nul, on pose

$$S_n = \sup(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad \text{et} \quad Y_n = \frac{S_n}{n}.$$

On admet que S_n et Y_n sont des variables aléatoires à densité définies, elles aussi, sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

- 2) Déterminer la fonction de répartition, notée F , commune aux variables aléatoires X_k .
- 3) On note G_n la fonction de répartition de la variable aléatoire Y_n . Déterminer explicitement $G_n(x)$ en fonction de n et x .
- 4) a) Montrer que, pour tout réel x négatif ou nul, on a $G_n(x) \leq \frac{1}{2^n}$.
- b) Justifier que, pour tout réel x strictement positif, il existe un entier naturel n_0 non nul tel que, pour tout entier $n \geq n_0$, $x > \frac{1}{n}$.
En déduire que

$$\forall x > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}^*, \quad \forall n \geq n_0, \quad G_n(x) = \left(1 - \frac{1}{2nx}\right)^n.$$

- 5) **a)** Déterminer, pour tout réel x , la limite de $G_n(x)$ lorsque n tend vers $+\infty$. On note $G(x)$ cette limite.
- b)** Montrer que la fonction G ainsi définie est la fonction de répartition d'une variable aléatoire à densité.
- c)** En déduire que la suite $(Y_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers une variable aléatoire Y dont la fonction de répartition est G .
- 6) Vérifier que la variable aléatoire $\frac{1}{Y}$ suit une loi exponentielle dont on précisera le paramètre.

Problème

Thèmes abordés : intégrales ; intégrales généralisées ; suites ; séries ; Probabilité discrètes.

On considère deux variables aléatoires X et Y définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, indépendantes, et suivant toutes les deux la loi de Poisson de paramètre λ , où λ désigne un réel strictement positif. On se propose de déterminer un équivalent de la probabilité $P(X = Y)$ lorsque λ est au voisinage de $+\infty$.

Partie I — Étude d'une suite d'intégrales

Pour tout entier naturel n , on pose

$$u_n = \int_0^{\pi/2} (\sin t)^n dt.$$

- 1)
 - a) Calculer u_0 et u_1 .
 - b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
 - c) Établir que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$. En déduire que la suite (u_n) est convergente.
- 2)
 - a) Montrer, grâce à une intégration par parties, que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n+2)u_{n+2} = (n+1)u_n.$$

- b) En déduire que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{2n} = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \times \frac{\pi}{2}.$$

- c) Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n+1)u_{n+1}u_n = \frac{\pi}{2}.$$

- d) En déduire la valeur de u_{2n+1} .

- 3)
 - a) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+2}}{u_n}$.

- b) En déduire, en utilisant les variations de (u_n) , que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1.$$

- c) Montrer enfin que

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

Partie II — Étude d'une intégrale

- 1) Établir, pour tout réel x , la convergence de l'intégrale

$$I(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

Dans la suite de cette partie, x désigne un réel strictement positif.

- 2) a) Montrer qu'il existe une constante M telle que

$$0 \leq \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1-t^2}} dt \leq M.$$

- b) Montrer que

$$\forall u \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \quad 1 \leq \frac{1}{\sqrt{1-u}} \leq 1+u.$$

- 3) a) En se référant à une loi normale, donner les valeurs de

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt.$$

- b) Utiliser le changement de variable $u = \sqrt{xt}$ pour montrer que

$$\int_0^1 \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{x}}.$$

- c) Montrer de la même façon que

$$\int_0^1 e^{-xt} \sqrt{t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}}{2x\sqrt{x}}.$$

- 4) a) Montrer, grâce au changement de variable $u = 1+t$, que

$$\int_{-1}^0 \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{e^x}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{e^{-xu}}{\sqrt{u(1-u/2)}} du.$$

- b) Utiliser le résultat de la question 2.b) pour en déduire que

$$I(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}}.$$

Partie III — Application probabiliste

1) Exprimer comme somme d'une série la probabilité $P(X = Y)$.

2) a) On désigne par t un réel de $[-1, 1]$ et par x un réel strictement positif. Montrer que, pour tout u compris entre 0 et $-tx$, on a $e^u \leq e^{-tx}$. Écrire ensuite l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre $2n$ pour la fonction $u \mapsto e^u$ entre 0 et $-tx$.

b) Montrer que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \int_0^1 \frac{t^{2k}}{\sqrt{1-t^2}} dt = u_{2k}.$$

c) Dédire des deux questions précédentes que

$$\left| I(x) - \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(k!)^2 2^{2k}} \right| \leq \frac{2x^{2n+1}e^x}{\pi(2n+1)!} u_{2n+1}.$$

d) Montrer enfin que

$$\forall x > 0, \quad I(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{(k!)^2 2^{2k}}.$$

3) Établir que

$$P(X = Y) \underset{\lambda \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{\pi\lambda}}.$$