

HEC Paris – ESSEC

Mathématiques approfondies – Mathématiques I

Corrigé du sujet adapté – 2017

Les questions et sous-questions conservent la numérotation de l'énoncé adapté.

Partie I – Quelques propriétés des polynômes de Bernstein

Partie I – Les polynômes $B_{n,k}$ et l'endomorphisme T_n

$$B_{n,k} = \binom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k}, \quad T_n(P) = \sum_{k=0}^n P\left(\frac{k}{n}\right) B_{n,k}.$$

Corrigé – Partie I.

1. Le cas $n = 2$.

- a) $B_{2,0} = (1-X)^2 = 1 - 2X + X^2$, $B_{2,1} = 2X(1-X) = 2X - 2X^2$ et $B_{2,2} = X^2$. En plaçant en colonnes les coordonnées dans $\mathcal{C}_2$:

$$K_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- b) K_2 est triangulaire inférieure à coefficients diagonaux non nuls, donc inversible : la famille $(B_{2,0}, B_{2,1}, B_{2,2})$ est libre et formée de $3 = \dim \mathbb{R}_2[X]$ vecteurs.

$$(B_{2,0}, B_{2,1}, B_{2,2}) \text{ est une base de } \mathbb{R}_2[X].$$

- c) On a $T_2(P) = P(0)B_{2,0} + P(\frac{1}{2})B_{2,1} + P(1)B_{2,2}$, donc

$$T_2(A_0) = (1-X)^2 + 2X(1-X) + X^2 = ((1-X) + X)^2 = 1,$$

$$T_2(A_1) = \frac{1}{2} \cdot 2X(1-X) + X^2 = X,$$

$$T_2(A_2) = \frac{1}{4} \cdot 2X(1-X) + X^2 = \frac{1}{2}X + \frac{1}{2}X^2.$$

$$T_2(A_0) = A_0, \quad T_2(A_1) = A_1, \quad T_2(A_2) = \frac{1}{2}A_1 + \frac{1}{2}A_2, \quad H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

H_2 est triangulaire : ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux, donc $\text{Sp}(T_2) = \{1, \frac{1}{2}\}$.

Pour $V = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$: $(H_2 - I_3)V = 0 \iff \frac{c}{2} = 0 \iff c = 0$; $(H_2 - \frac{1}{2}I_3)V = 0 \iff a = 0 \text{ et } b + c = 0$.

$$E_1(T_2) = \text{Vect}(1, X), \quad E_{1/2}(T_2) = \text{Vect}(X^2 - X).$$

2. Cas général.

- a) Le coefficient de plus bas degré de $B_{n,k}$ est celui de X^k , égal à $\binom{n}{k} \neq 0$: $B_{n,k} = \binom{n}{k} X^k + (\text{termes de degré } > k)$.

Supposons $\sum_{k=0}^n \lambda_k B_{n,k} = 0$ avec les λ_k non tous nuls, et soit k_0 le plus petit indice tel que $\lambda_{k_0} \neq 0$. Le coefficient de X^{k_0} dans $\sum_{k \geq k_0} \lambda_k B_{n,k}$ vaut $\lambda_{k_0} \binom{n}{k_0} \neq 0$ (les $B_{n,k}$, $k > k_0$, n'ont pas de terme de degré k_0) : contradiction. La famille est libre, de cardinal $n+1 = \dim \mathbb{R}_n[X]$.

$$(B_{n,0}, \dots, B_{n,n}) \text{ est une base de } \mathbb{R}_n[X].$$

- b) Pour $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, $(\lambda P + Q)\left(\frac{k}{n}\right) = \lambda P\left(\frac{k}{n}\right) + Q\left(\frac{k}{n}\right)$, donc T_n est linéaire, et $T_n(P) \in \mathbb{R}_n[X]$: T_n est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

Si $T_n(P) = 0$, comme $(B_{n,k})$ est une base, $P\left(\frac{k}{n}\right) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$: P admet $n+1$ racines distinctes et $\deg P \leq n$, donc $P = 0$. Ainsi T_n est injectif, donc bijectif ($\mathbb{R}_n[X]$ est de dimension finie).

$$T_n \text{ est un automorphisme de } \mathbb{R}_n[X].$$

- c) Par la formule du binôme, $T_n(A_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k} = (X + (1-X))^n = 1$.
Pour $k \geq 1$, $\frac{k}{n} \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1}$, donc

$$\begin{aligned} T_n(A_1) &= \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} X^k (1-X)^{n-k} = X \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} X^j (1-X)^{n-1-j} \\ &= X(X + (1-X))^{n-1}. \end{aligned}$$

$$T_n(A_0) = A_0, \quad T_n(A_1) = A_1.$$

- d) Montrons par récurrence sur $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ que $T_n(A_k)$ est de degré k , de coefficient dominant $\alpha_k > 0$. C'est vrai pour $k = 0$ ($T_n(A_0) = 1$). Si c'est vrai au rang $k \leq n-1$, écrivons $T_n(A_k) = \alpha_k X^k + R$ avec $\deg R < k$. Dans la relation admise, $\frac{1}{n} X(1-X)(T_n(A_k))'$ et $X T_n(A_k)$ sont de degré au plus $k+1$, et le coefficient de X^{k+1} de $T_n(A_{k+1})$ vaut

$$-\frac{1}{n} \cdot k \alpha_k + \alpha_k = \alpha_k \left(1 - \frac{k}{n}\right) > 0 \quad (\text{car } k \leq n-1).$$

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad \deg T_n(A_k) = k.$$

- e) D'après d), $\alpha_0 = 1$ et $\alpha_{k+1} = \left(1 - \frac{k}{n}\right) \alpha_k$ pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, d'où

$$\alpha_k = \prod_{j=0}^{k-1} \frac{n-j}{n} = \frac{n!}{(n-k)! n^k}.$$

Comme $T_n(A_k) \in \text{Vect}(A_0, \dots, A_k)$, la matrice de T_n dans $\mathcal{C}_n$ est triangulaire supérieure de coefficients diagonaux $\alpha_0, \dots, \alpha_n$, qui sont donc les valeurs propres de T_n . On a $\alpha_0 = \alpha_1 = 1$ et, pour $1 \leq k \leq n-1$, $0 < \alpha_{k+1} = \left(1 - \frac{k}{n}\right) \alpha_k < \alpha_k$: les réels $1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sont deux à deux distincts.

D'après c), $E_1(T_n) \supset \text{Vect}(A_0, A_1)$, de dimension ≥ 2 ; pour $2 \leq k \leq n$, $\dim E_{\alpha_k}(T_n) \geq 1$. La somme des dimensions des sous-espaces propres est donc au moins $2 + (n-1) = n+1 = \dim \mathbb{R}_n[X]$ (pour $n=1$, $T_1 = \text{Id}$).

$$T_n \text{ est diagonalisable.}$$

Partie I – Approximation par les polynômes de Bernstein – Python

$$f_n(z) = \mathbb{E}(f(\bar{Z}_n)) \rightarrow f(z).$$

Corrigé – Partie I.**3. Convergence de $f_n(z)$.**

- a) $\mathbb{E}(\bar{Z}_n) = \frac{nz}{n} = z$ et $\mathbb{V}(\bar{Z}_n) = \frac{nz(1-z)}{n^2} = \frac{z(1-z)}{n}$. Pour $\varepsilon > 0$, l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev donne

$$\mathbb{P}(|\bar{Z}_n - z| \geq \varepsilon) \leq \frac{z(1-z)}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\boxed{\bar{Z}_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} z.}$$

- b) $|f|$ est continue sur le fermé borné $[0, 1]$; par le théorème des bornes atteintes,

$$\boxed{M = \max_{[0,1]} |f| \text{ existe.}}$$

- c) $\bar{Z}_n$ prend ses valeurs dans $[0, 1]$, donc $|f(\bar{Z}_n) - f(z)| \leq |f(\bar{Z}_n)| + |f(z)| \leq 2M$. Sur U_n , on a donc $|f(\bar{Z}_n) - f(z)| \leq 2M$; sur $\bar{U}_n$, $|f(\bar{Z}_n) - f(z)| \leq \varepsilon$. Comme $\mathbf{1}_{U_n} + \mathbf{1}_{\bar{U}_n} = 1$:

$$\boxed{|f(\bar{Z}_n) - f(z)| \leq 2M \mathbf{1}_{U_n} + \varepsilon \mathbf{1}_{\bar{U}_n}.$$

- d) f est continue en z : il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $y \in [0, 1]$, $|y - z| < \eta \Rightarrow |f(y) - f(z)| \leq \varepsilon$. Ainsi $U_n \subset \{|\bar{Z}_n - z| \geq \eta\}$ et, d'après a), $\mathbb{P}(U_n) \rightarrow 0$. Par croissance et linéarité de l'espérance (variables finies), c) donne

$$|\mathbb{E}(f(\bar{Z}_n)) - f(z)| \leq \mathbb{E}(|f(\bar{Z}_n) - f(z)|) \leq 2M \mathbb{P}(U_n) + \varepsilon \mathbb{P}(\bar{U}_n) \leq 2M \mathbb{P}(U_n) + \varepsilon.$$

Il existe n_1 tel que pour $n \geq n_1$, $2M \mathbb{P}(U_n) \leq \varepsilon$, et alors $|\mathbb{E}(f(\bar{Z}_n)) - f(z)| \leq 2\varepsilon$. Donc $\mathbb{E}(f(\bar{Z}_n)) \rightarrow f(z)$. Par le théorème de transfert,

$$\mathbb{E}(f(\bar{Z}_n)) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \mathbb{P}(Z_n = k) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} z^k (1-z)^{n-k} = f_n(z).$$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(f(\bar{Z}_n)) = f(z) \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(z) = f(z).}$$

4. Python.

- a) Il suffit d'utiliser le simulateur de la loi binomiale :

```
def binom(n, z):
    Z = rd.binomial(n, z)
    return Z
```

- b) Le programme calcule la moyenne de $N = 1000$ réalisations indépendantes de $f(\bar{Z}_{100})$, avec $z = 0,4$.

D'après la loi faible des grands nombres, cette moyenne empirique approche $\mathbb{E}(f(\bar{Z}_{100})) = f_{100}(0,4)$ (méthode de Monte-Carlo) ; d'après la question 3, $f_{100}(0,4)$ est elle-même une approximation de $f(0,4)$ (approximation par les polynômes de Bernstein).

Valeur approchée de $f(0,4) = -0,4 \ln(0,4) \simeq 0,37$
(méthode de Monte-Carlo via la LFGN et approximation de Bernstein).

Partie II – Les polynômes d'interpolation de Lagrange

Partie II – Interpolation de Lagrange et erreur d'interpolation

$$\Phi(P) = (P(x_0), \dots, P(x_n)), \text{ base } (L_i), f - P_f = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} w.$$

Corrigé – Partie II.

5. L'isomorphisme Φ .

- a) Φ est linéaire (l'évaluation en un point est linéaire). Si $\Phi(P) = 0$, P admet les $n+1$ racines distinctes $x_0, \dots, x_n$ et $\deg P \leq n$, donc $P = 0$: Φ est injective. Comme $\dim \mathbb{R}_n[X] = n+1 = \dim \mathbb{R}^{n+1}$:

Φ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

- b) Notons $M_i = \prod_{k \neq i} \frac{X - x_k}{x_i - x_k}$ (dénominateurs non nuls). M_i est de degré n , $M_i(x_j) = 0$ pour $j \neq i$ (facteur $X - x_j$) et $M_i(x_i) = 1$. Donc $\Phi(M_i) = e_i = \Phi(L_i)$, et par injectivité de Φ :

$$L_i(X) = \prod_{\substack{k \in \llbracket 0, n \rrbracket \\ k \neq i}} \frac{X - x_k}{x_i - x_k}.$$

- c) Ψ est symétrique, et linéaire par rapport à la première variable (donc bilinéaire). $\Psi(P, P) = \sum_k P(x_k)^2 \geq 0$, et si $\Psi(P, P) = 0$, alors $P(x_k) = 0$ pour tout k , donc $P = 0$ comme en a). Ψ est un produit scalaire.

Comme $L_i(x_k) = \delta_{i,k}$ (symbole de Kronecker), $\Psi(L_i, L_j) = \sum_k \delta_{i,k} \delta_{j,k} = \delta_{i,j}$: la famille $(L_0, \dots, L_n)$ est orthonormée, donc libre, de cardinal $n+1 = \dim \mathbb{R}_n[X]$.

Ψ est un produit scalaire et $(L_0, \dots, L_n)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}_n[X]$.

- d) Dans une base orthonormée, $X^j = \sum_{i=0}^n \Psi(X^j, L_i) L_i$ et $\Psi(X^j, L_i) = \sum_k x_k^j L_i(x_k) = x_i^j$. La colonne j de A contient les coordonnées de X^j dans (L_i) :

$$A = (x_i^j)_{0 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}.$$

- e) Les conditions s'écrivent $\Phi(P_f) = (f(x_0), \dots, f(x_n))$; Φ étant bijective, il existe un unique tel polynôme. Comme $(f(x_0), \dots, f(x_n)) = \sum_i f(x_i) e_i = \Phi(\sum_i f(x_i) L_i)$:

$$P_f = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i.$$

6. Erreur d'interpolation.

- a) $Q_f - P_f \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$ s'annule en $x_0, \dots, x_n$ (deux à deux distincts), donc est divisible par w , de degré $n+1$: $Q_f - P_f = w \times R$ avec $\deg R \leq 0$, c'est-à-dire R constant égal à un réel δ .

$$\exists \delta \in \mathbb{R}, \forall t \in [a, b], \quad Q_f(t) - P_f(t) = \delta w(t).$$

- b)** $h(x_k) = f(x_k) - Q_f(x_k) = 0$ et $h(\bar{x}) = 0$ par définition de Q_f : h s'annule en $n+2$ points distincts de $[a, b]$. h est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[a, b]$. En appliquant le théorème de Rolle entre deux zéros consécutifs, h' s'annule en au moins $n+1$ points distincts de $]a, b[$; par récurrence, $h^{(j)}$ s'annule en au moins $n+2-j$ points distincts de $]a, b[$ pour $j \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$.

$$\boxed{\exists \theta \in]a, b[, \quad h^{(n+1)}(\theta) = 0.}$$

- c)** $Q_f = P_f + \delta w$ avec $\deg P_f \leq n$ et w unitaire de degré $n+1$, donc $Q_f^{(n+1)} = \delta (n+1)!$ et $h^{(n+1)}(\theta) = f^{(n+1)}(\theta) - \delta (n+1)! = 0$. Ainsi $\delta = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}$, et comme $Q_f(\bar{x}) = f(\bar{x})$, a) en $t = \bar{x}$ donne :

$$\boxed{f(\bar{x}) - P_f(\bar{x}) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\theta) w(\bar{x}).}$$

- d)** $f^{(n+1)}$ est continue sur le fermé borné $[a, b]$, donc bornée (bornes atteintes). Si $t \notin \{x_0, \dots, x_n\}$, c) avec $\bar{x} = t$ donne $|f(t) - P_f(t)| = \frac{|f^{(n+1)}(\theta)|}{(n+1)!} |w(t)| \leq \frac{|w(t)|}{(n+1)!} \sup_{[a, b]} |f^{(n+1)}|$. Si $t = x_k$, les deux membres sont nuls.

$$\boxed{\forall t \in [a, b], \quad |f(t) - P_f(t)| \leq \frac{1}{(n+1)!} |w(t)| \sup_{[a, b]} |f^{(n+1)}|.$$

Partie III – Exemple d'interpolation et phénomène de Runge

Partie III – Une condition suffisante de convergence

Dérivées de f_ρ , majoration de $|w_n|$ et convergence pour $\rho > 1 + \frac{2}{e}$.

Corrigé – Partie III.

7. Régularité de f_ρ .

a) $x \mapsto x^2 + \rho^2$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule pas ($\rho > 0$) ; par quotient :

$$f_\rho \text{ est de classe } \mathcal{C}^\infty \text{ sur } \mathbb{R}.$$

b) f_ρ est paire : $f_\rho(x) = f_\rho(-x)$. En dérivant n fois (récurrence immédiate), $f_\rho^{(n)}(x) = (-1)^n f_\rho^{(n)}(-x)$, d'où

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, |f_\rho^{(n)}(x)| = |f_\rho^{(n)}(-x)|.$$

c) Pour $|x| < \rho$, $q = -\frac{x^2}{\rho^2} \in]-1, 0]$, donc la série géométrique $\sum q^k$ converge et

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\rho^{2k+2}} x^{2k} = \frac{1}{\rho^2} \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{1}{\rho^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x^2}{\rho^2}}, \quad \frac{1}{x^2 + \rho^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\rho^{2k+2}} x^{2k}.$$

8. Majoration des dérivées.

a) Pour $x \in]-\rho, \rho[$, $\frac{p}{\rho-x} + \frac{q}{\rho+x} = \frac{(p+q)\rho + (p-q)x}{\rho^2 - x^2}$. L'égalité avec $v(x)$ pour tout $x \in]-\rho, \rho[$ équivaut à $(p-q)x + (p+q)\rho - \rho^2 = 0$ pour une infinité de x , soit $p-q=0$ et $(p+q)\rho = \rho^2$.

$$p = q = \frac{\rho}{2}.$$

b) v est paire ; comme en 7.b), $v^{(n)}(x) = (-1)^n v^{(n)}(-x)$:

$$|v^{(n)}(x)| = |v^{(n)}(-x)|.$$

c) Par récurrence, $(\frac{1}{\rho-x})^{(n)} = \frac{n!}{(\rho-x)^{n+1}}$ et $(\frac{1}{\rho+x})^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(\rho+x)^{n+1}}$. Avec a) :

$$v^{(n)}(x) = \frac{\rho n!}{2} \left(\frac{1}{(\rho-x)^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{(\rho+x)^{n+1}} \right).$$

d) Si $\rho > 1$ et $x \in [-1, 1] \subset]-\rho, \rho[$, alors $\rho-x \geq \rho-1 > 0$ et $\rho+x \geq \rho-1 > 0$, donc d'après c)

$$|v^{(n)}(x)| \leq \frac{\rho n!}{2} \cdot \frac{2}{(\rho-1)^{n+1}} = \frac{\rho n!}{(\rho-1)^{n+1}}.$$

Avec le résultat admis :

$$|f_\rho^{(n)}(x)| \leq \frac{1}{\rho^2} |v^{(n)}(x)| \leq \frac{1}{\rho} \times \frac{n!}{(\rho-1)^{n+1}}.$$

9. Majoration de $|w_n|$.

- a) Pour $j \leq k : 0 < x - x_{j,n} < x_{k+1,n} - x_{j,n} = \frac{2}{n}(k+1-j)$; pour $j \geq k+1 : 0 < x_{j,n} - x < x_{j,n} - x_{k,n} = \frac{2}{n}(j-k)$. Donc

$$|w_n(x)| \leq \left(\frac{2}{n}\right)^{n+1} \prod_{j=0}^k (k+1-j) \prod_{j=k+1}^n (j-k) = \left(\frac{2}{n}\right)^{n+1} (k+1)! (n-k)!.$$

Ensuite $(k+1)! (n-k)! = (k+1) \frac{n!}{\binom{n}{k}}$ et, pour $0 \leq k \leq n-1$, $\binom{n}{k} \geq \binom{n}{k+1} = k+1$ (la suite $m \mapsto \binom{m}{k}$ est croissante d'après la formule de Pascal). Ainsi $(k+1)! (n-k)! \leq n!$.

$$|w_n(x)| \leq \left(\frac{2}{n}\right)^{n+1} (k+1)! (n-k)! \leq \left(\frac{2}{n}\right)^{n+1} n!.$$

- b) Par la formule de Stirling,

$$\frac{(2/n)^{n+1} n!}{(2/e)^{n+1}} = \frac{e^{n+1} n!}{n^{n+1}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{n+1} n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}{n^{n+1}} = \frac{e\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} 0.$$

Il existe donc n_0 tel que pour $n \geq n_0$, ce quotient est ≤ 1 . Avec a) (et $w_n(x) = 0$ si x est l'un des $x_{k,n}$) :

$$\exists n_0, \forall n \geq n_0, \forall x \in [-1, 1], |w_n(x)| \leq \left(\frac{2}{e}\right)^{n+1}.$$

- c) Supposons $\rho > 1 + \frac{2}{e}$ (donc $\rho > 1$). Pour $n \geq n_0$ et $x \in [-1, 1]$, 6.d) sur $[a, b] = [-1, 1]$, 9.b) et 8.d) (au rang $n+1$) donnent

$$|f_\rho(x) - P_{f_\rho, n}(x)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{2}{e}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{\rho} \cdot \frac{(n+1)!}{(\rho-1)^{n+2}} = \frac{1}{\rho(\rho-1)} \left(\frac{2}{e(\rho-1)}\right)^{n+1}.$$

Comme $0 < \frac{2}{e(\rho-1)} < 1$, le majorant tend vers 0 ; par le théorème d'encadrement :

$$\rho > 1 + \frac{2}{e} \implies \forall x \in [-1, 1], \lim_{n \rightarrow +\infty} |f_\rho(x) - P_{f_\rho, n}(x)| = 0.$$

Partie III – La fonction H et le phénomène de Runge

$H(\rho) = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 \ln(t^2 + \rho^2) dt$, ρ_0 , $\Omega_n(\rho)$ et divergence pour $0 < \rho < \rho_0$.

Corrigé – Partie III.**10. La fonction H .**

- a) On intègre par parties sur le segment $[-1, 1]$ avec $u(t) = \ln(t^2 + \rho^2)$ et $v(t) = t$, de classe $\mathcal{C}^1$, $u'(t) = \frac{2t}{t^2 + \rho^2}$, $v'(t) = 1$:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \ln(t^2 + \rho^2) dt &= [t \ln(t^2 + \rho^2)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{2t^2}{t^2 + \rho^2} dt \\ &= 2 \ln(1 + \rho^2) - 2 \int_{-1}^1 \left(1 - \frac{\rho^2}{t^2 + \rho^2}\right) dt \\ &= 2 \ln(1 + \rho^2) - 4 + 2\rho^2 \left[\frac{1}{\rho} \arctan \frac{t}{\rho} \right]_{-1}^1 \\ &= 2 \ln(1 + \rho^2) - 4 + 4\rho \arctan \frac{1}{\rho}. \end{aligned}$$

$$H(\rho) = \frac{1}{2} \ln(1 + \rho^2) - 1 + \rho \arctan\left(\frac{1}{\rho}\right).$$

Comme $0 \leq \rho \arctan \frac{1}{\rho} \leq \frac{\pi\rho}{2} \rightarrow 0$ quand $\rho \rightarrow 0^+$, $H(\rho) \rightarrow -1$:

$$H \text{ se prolonge par continuité en } 0 \text{ en posant } H(0) = -1.$$

- b) H est continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $]0, +\infty[$ avec

$$H'(\rho) = \frac{\rho}{1 + \rho^2} + \arctan \frac{1}{\rho} + \rho \cdot \frac{-1/\rho^2}{1 + 1/\rho^2} = \arctan \frac{1}{\rho} > 0.$$

H est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. De plus $0 \leq \rho \arctan \frac{1}{\rho} \leq \rho \cdot \frac{1}{\rho} = 1$ (car $\arctan u \leq u$ pour $u \geq 0$) et $\ln(1 + \rho^2) \rightarrow +\infty$, donc $H(\rho) \rightarrow +\infty$. Par le théorème de la bijection :

$$H \text{ réalise une bijection strictement croissante de } \mathbb{R}_+ \text{ sur } [-1, +\infty[.$$

- c) $\ln 2 - 1 \in]-1, +\infty[$, donc il existe un unique $\rho_0 \in \mathbb{R}_+$ tel que $H(\rho_0) = \ln 2 - 1$, et $\rho_0 \neq 0$ car $H(0) = -1 \neq \ln 2 - 1$. Enfin $H(1) - (\ln 2 - 1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 > 0,78 - 0,35 > 0$, donc $H(\rho_0) < H(1)$ et, H étant strictement croissante :

$$\exists! \rho_0 > 0, \quad H(\rho_0) = \ln 2 - 1, \quad \rho_0 < 1.$$

- d) Chaque facteur $\sqrt{x_{k,n}^2 + \rho^2}$ est strictement positif ($\rho > 0$), donc $\Omega_n(\rho) > 0$. Notons $g(t) = \ln(t^2 + \rho^2)$, continue sur $[-1, 1]$. Alors

$$\frac{1}{n} \ln \Omega_n(\rho) = \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^n g\left(-1 + \frac{2k}{n}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(-1 + k \frac{2}{n}\right) + \frac{g(1)}{2n}.$$

Le premier terme est une somme de Riemann de g sur $[-1, 1]$: par le théorème sur les sommes de Riemann, il tend vers $\frac{1}{4} \int_{-1}^1 g(t) dt = H(\rho)$, et $\frac{g(1)}{2n} \rightarrow 0$.

$$\Omega_n(\rho) > 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \ln \Omega_n(\rho) = H(\rho).$$

11. Recherche de ρ_0 en Python.

- a) Pour $x > 0$, $G(x) = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \ln 2 + x \arctan \frac{1}{x} = H(x) + 1 - \ln 2$. G est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$. De plus $G(1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 > 0$ et, comme $\arctan 4 < \frac{\pi}{2}$ et $\ln(1+u) \leq u$, $H(0,25) \leq \frac{0,0625}{2} - 1 + \frac{\pi}{8} < -0,5$, donc $G(0,25) < 0$. Le programme maintient $G(u) \leq 0 \leq G(v)$ en divisant par deux la longueur de $[u, v]$ à chaque étape, jusqu'à ce qu'elle soit inférieure à 0,001 : c'est la méthode de dichotomie, et le milieu affiché approche à 0,001 près le zéro de G dans $[0,25; 1]$.

$$\text{Méthode de dichotomie ; } G(s_0) = 0, \text{ soit } \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+s_0^2}{4}\right) + s_0 \arctan\left(\frac{1}{s_0}\right) = 0.$$

- b) $G(s_0) = 0 \iff H(s_0) = \ln 2 - 1$, et ρ_0 est l'unique solution de cette équation (10.c).

$$s_0 = \rho_0 (\simeq 0,526).$$

12. Le polynôme S_n .

- a) Pour tout k , $S_n(x_{k,n}) = 1 - (x_{k,n}^2 + \rho^2)f_\rho(x_{k,n}) = 0$. S_n admet les $n+1$ racines distinctes $x_{0,n}, \dots, x_{n,n}$:

$$w_n \text{ divise } S_n.$$

- b) Soit $Q(X) = P_{f_\rho,n}(-X) \in \mathbb{R}_n[X]$. Comme $x_{n-k,n} = 1 - \frac{2k}{n} = -x_{k,n}$ et f_ρ est paire,

$$Q(x_{k,n}) = P_{f_\rho,n}(x_{n-k,n}) = f_\rho(x_{n-k,n}) = f_\rho(-x_{k,n}) = f_\rho(x_{k,n}).$$

Par unicité du polynôme d'interpolation (5.e), $Q = P_{f_\rho,n}$.

$$P_{f_\rho,n} \text{ est pair.}$$

- c) $y_n - x_{k,n} = \frac{2(n-k)-1}{n}$, donc, en posant $j = n - k$,

$$|w_n(y_n)| = \frac{1}{n^{n+1}} \prod_{j=0}^n |2j-1| = \frac{1}{n^{n+1}} \prod_{j=1}^n (2j-1) = \frac{1}{n^{n+1}} \cdot \frac{(2n)!}{\prod_{j=1}^n (2j)},$$

$$|w_n(y_n)| = \frac{(2n)!}{2^n n! n^{n+1}}.$$

Par la formule de Stirling, $(2n)! \sim (2n)^{2n} e^{-2n} \sqrt{4\pi n}$ et $n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$:

$$|w_n(y_n)| \sim \frac{4^n n^{2n} e^{-2n} 2\sqrt{\pi n}}{2^n n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n} n^{n+1}} = \frac{\sqrt{2}}{n} \left(\frac{2}{e}\right)^n,$$

$$|w_n(y_n)| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2}}{n} \left(\frac{2}{e}\right)^n \quad (\tau = \sqrt{2}, \sigma = \frac{2}{e}).$$

- d) Posons $\varepsilon_n = \ln \Omega_n(\rho) - nH(\rho) - \frac{1}{2} \ln(1+\rho^2) \rightarrow 0$. Alors $\Omega_n(\rho) = \sqrt{1+\rho^2} e^{nH(\rho)} e^{\varepsilon_n} \sim \sqrt{1+\rho^2} e^{nH(\rho)}$. Avec c), par quotient d'équivalents :

$$\frac{|w_n(y_n)|}{\Omega_n(\rho)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2}}{n\sqrt{1+\rho^2}} e^{n(\ln 2 - 1 - H(\rho))}.$$

13. Cas n impair.

- a) On a vu $x_{n-k,n} = -x_{k,n}$. Comme n est impair, $k \neq n-k$ pour tout k , et les indices se regroupent en paires $\{k, n-k\}$ avec $k \in \llbracket 0, \frac{n-1}{2} \rrbracket$:

$$w_n(X) = \prod_{k=0}^{(n-1)/2} (X - x_{k,n})(X + x_{k,n}), \quad \boxed{w_n(X) = \prod_{k=0}^{(n-1)/2} (X^2 - x_{k,n}^2)}.$$

De même, $\Omega_n(\rho) = \prod_{k=0}^{(n-1)/2} \sqrt{x_{k,n}^2 + \rho^2} \sqrt{x_{n-k,n}^2 + \rho^2} = \prod_{k=0}^{(n-1)/2} (x_{k,n}^2 + \rho^2)$, et

$$|W_n(-\rho^2)| = \prod_{k=0}^{(n-1)/2} |-\rho^2 - x_{k,n}^2| = \prod_{k=0}^{(n-1)/2} (x_{k,n}^2 + \rho^2), \quad \boxed{|W_n(-\rho^2)| = \Omega_n(\rho)}.$$

- b) Écrivons $P_{f_\rho,n} = \sum_j a_j X^j$. Comme $P_{f_\rho,n}(-X) = P_{f_\rho,n}(X)$ (12.b), $a_j = 0$ pour j impair ; n étant impair, les puissances paires sont $\leq n-1$. Ainsi $P_{f_\rho,n}(X) = Q_n(X^2)$ avec $Q_n = \sum_{m=0}^{(n-1)/2} a_{2m} X^m$, de degré $\leq \frac{n-1}{2}$.

Alors $S_n(X) = T(X^2)$ avec $T(Y) = 1 - (Y + \rho^2)Q_n(Y)$, de degré $\leq \frac{n+1}{2}$. Pour $k \in \llbracket 0, \frac{n-1}{2} \rrbracket$, $T(x_{k,n}^2) = S_n(x_{k,n}) = 0$ (12.a), et les réels $x_{k,n}^2$ sont deux à deux distincts (les $x_{k,n}$, $k \leq \frac{n-1}{2}$, sont strictement négatifs et distincts). T est donc divisible par W_n , unitaire de degré $\frac{n+1}{2}$: $T = c W_n$ avec $c \in \mathbb{R}$. En $Y = -\rho^2$: $1 = T(-\rho^2) = c W_n(-\rho^2)$, avec $W_n(-\rho^2) \neq 0$ d'après a).

$$\boxed{S_n(X) = \frac{W_n(X^2)}{W_n(-\rho^2)} = \frac{w_n(X)}{W_n(-\rho^2)}}.$$

- c) Pour x réel, $f_\rho(x) - P_{f_\rho,n}(x) = \frac{1 - (x^2 + \rho^2)P_{f_\rho,n}(x)}{x^2 + \rho^2} = f_\rho(x)S_n(x) = f_\rho(x) \frac{w_n(x)}{W_n(-\rho^2)}$. Avec a) et $f_\rho > 0$:

$$\boxed{\forall x \in [-1, 1], \quad |f_\rho(x) - P_{f_\rho,n}(x)| = f_\rho(x) \frac{|w_n(x)|}{\Omega_n(\rho)}}.$$

14. Phénomène de Runge ($0 < \rho < \rho_0$, n impair).

- a) D'après 13.c) et 12.d), et puisque $f_\rho(y_n) \rightarrow f_\rho(1) = \frac{1}{1+\rho^2}$ (continuité),

$$|f_\rho(y_n) - P_{f_\rho,n}(y_n)| = f_\rho(y_n) \frac{|w_n(y_n)|}{\Omega_n(\rho)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2}}{(1 + \rho^2)^{3/2}} \cdot \frac{e^{nc}}{n},$$

où

$$c = \ln 2 - 1 - H(\rho) = H(\rho_0) - H(\rho).$$

Comme H est strictement croissante et $\rho < \rho_0$, $c > 0$, et $\frac{e^{nc}}{n} \rightarrow +\infty$ par croissances comparées.

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_\rho(y_n) - P_{f_\rho,n}(y_n)| = +\infty}.$$

- b) $y_n \in [0, 1[\subset [-1, 1]$, donc $\sup_{[-1, 1]} |f_\rho - P_{f_\rho,n}| \geq |f_\rho(y_n) - P_{f_\rho,n}(y_n)|$. Par comparaison avec a) :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [-1, 1]} |f_\rho(x) - P_{f_\rho,n}(x)| = +\infty}.$$