

Sujet de l'EDHEC 2018 (Clermont)

Exercice 1. Soit f la fonction définie par : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{2}{(e^x + e^{-x})^2}$.

- (1) Etudier la parité de f .
- (2) Montrer que f peut être considérée comme densité d'une certaine variable aléatoire X .
- (3) (a) Montrer que X possède une espérance et donner sa valeur.
(b) Montrer que X possède une variance.
- (4) On note F la fonction de répartition de X . Montrer que F est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, 1[$.
- (5) On considère la variable aléatoire Y définie par $Y = F(X)$.
(a) Déterminer la loi de Y .
(b) Déterminer explicitement $F(x)$ pour tout réel x .
(c) Etablir que la fonction F^{-1} , bijection réciproque de F , est définie par :

$$\forall x \in]0, 1[, F^{-1}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x}{1-x} \right).$$

- (d) En déduire un script Scilab permettant de simuler la variable aléatoire X .

Exercice 2. Si k est un entier naturel non nul, alors pour tout endomorphisme f d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E , on note $f^k = f \circ \dots \circ f$ (où l'endomorphisme f apparaît k fois dans cette composition) et on pose $f^0 = \text{Id}_E$, où Id_E est l'endomorphisme identité de E . On dit que l'endomorphisme f est nilpotent d'indice k ($k \in \mathbb{N}^*$) si $f^k = 0$ et $f^{k-1} \neq 0$. De plus, on note I_2 la matrice identité de $M_2(\mathbb{R})$ et on dit qu'une matrice A de $M_2(\mathbb{R})$ est nilpotente d'indice k ($k \in \mathbb{N}^*$) si $A^k = 0$ et $A^{k-1} \neq 0$ (avec la convention $A^0 = I_2$).

Partie 1 : Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice non nulle de $M_2(\mathbb{R})$.

- (1) Calculer $A^2 - (a+d)A$ en fonction de I_2 .
- (2) On suppose dans cette question que A est nilpotente d'indice k .
(a) Etablir l'égalité : $ad - bc = 0$.
(b) Montrer que k est supérieur ou égal à 2.
(c) En déduire alors que $a + d = 0$.
- (3) Conclure que : A nilpotente $\iff A^2 = 0$.

Partie 2 : Dans cette partie, f désigne un endomorphisme $\neq 0$ d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E de dimension 2.

- (1) (a) Montrer que, si $\ker(f) = \mathfrak{Im}(f)$, alors on a : $f^2 = 0$.
(b) On suppose que $f^2 = 0$. Montrer que $\mathfrak{Im}(f) \subset \ker(f)$. Etablir alors que $\text{rg}(f) = 1$ puis conclure que $\ker(f) = \mathfrak{Im}(f)$.
(c) En déduire, à l'aide de la partie 1, l'équivalence : f est nilpotent $\iff \ker(f) = \mathfrak{Im}(f)$.

On suppose dans toute la suite que f est nilpotent et on en étudie quelques propriétés.

- (2) Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice A de f est : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- (3) On souhaite montrer par l'absurde qu'il est impossible de trouver deux endomorphismes u et v de E , nilpotents et tels que $f = u \circ v$. On suppose donc que ces deux endomorphismes existent.
(a) Montrer les inclusions : $\mathfrak{Im}(f) \subset \mathfrak{Im}(u)$ et $\ker(v) \subset \ker(f)$.
(b) En déduire les égalités : $\mathfrak{Im}(f) = \mathfrak{Im}(u)$ et $\ker(v) = \ker(f)$.
(c) En déduire l'égalité : $\ker(u) = \mathfrak{Im}(v)$.
(d) Conclure.

Exercice 3. Dans cet exercice, n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2. On note I_n la matrice identité de $M_n(\mathbb{R})$ et J_n la matrice de $M_n(\mathbb{R})$ dont tous les éléments valent 1.

- (1) (a) Déterminer le rang de J_n . En déduire que 0 est valeur propre de J_n et déterminer la dimension du sous-espace propre associé.
- (b) Vérifier que le vecteur V_n élément de $M_{n,1}(\mathbb{R})$, dont toutes les composantes sont égales à 1, est vecteur propre de J_n .
- (c) A l'aide des questions précédentes, donner les valeurs propres de J_n .


Dans toute la suite, on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}^n$ par :

$$\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \quad f_n(x) = \left(\sum_{k=1}^n x_k \right) \exp \left(- \sum_{k=1}^n x_k^2 \right).$$

- (1) Montrer que f_n est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^n$.
- (2) (a) Montrer que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a : $\partial_i(f_n)(x) = \left(1 - 2x_i \sum_{k=1}^n x_k \right) \exp \left(- \sum_{k=1}^n x_k^2 \right)$.
- (b) En déduire que f_n possède deux points critiques $a = \frac{1}{\sqrt{2n}}(1, 1, \dots, 1)$ et $b = -a$.
- (3) (a) Déterminer les dérivées partielles d'ordre 2 de f_n .
- (b) Vérifier que la hessienne de f_n en a est $H_n(a) = \frac{-2}{\sqrt{2ne}}(nI_n + J_n)$.
- (c) A l'aide de la première question, donner les valeurs propres de $H_n(a)$.
- (d) En déduire que f_n possède un extremum local en a .
- (e) Sans refaire tous les calculs, donner une conclusion concernant le point critique b .
- (4) (a) Etudier la fonction h qui, à tout t de $\mathbb{R}_+$, associe $h(t) = te^{-t^2}$.
- (b) En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz à deux vecteurs bien choisis de $\mathbb{R}^n$, muni de son produit scalaire canonique, montrer que :

$$\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \quad \left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2.$$

- (c) Déduire des deux questions précédentes que f_n admet en a et en b des extrema globaux.
- (5) Question d'informatique.
 - (a) Ecrire des commandes **Scilab** permettant de calculer et d'afficher $H_n(a)$ pour une valeur de n entrée par l'utilisateur.
 - (b) Dans le cas $n = 2$, la nappe suivante est-elle acceptable en tant que représentation graphique de la fonction f_2 ? Justifier.



Problème 1. On effectue des lancers d'une pièce donnant pile avec la probabilité p , élément de $]0, 1[$, et donnant face avec la probabilité $q = 1 - p$, les différents lancers étant supposés indépendants. Pour tout entier naturel k non nul, on note P_k (resp. F_k) l'événement : "la pièce donne pile (resp. face) au $k^{\text{ème}}$ lancer", on note également S_k le rang du $k^{\text{ème}}$ pile et T_k le rang d'apparition du dernier pile de la première série de k piles consécutifs. On suppose que S_k et T_k sont deux variables aléatoires toutes deux définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Par exemple, si les lancers donnent $F_1, P_2, F_3, P_4, F_5, P_6, P_7, P_8$, alors S_1 et T_1 prennent la valeur 2, S_2 prend la valeur 4, T_2 prend la valeur 7, S_3 prend la valeur 6, T_3 prend la valeur 8, S_4 prend la valeur 7 et S_5 prend la valeur 8.

Partie 1 : simulations de S_k et T_k .

- (1) Compléter les lignes 7 et 10 du script Scilab suivant pour qu'il affiche la valeur prise par S_k lorsque k et p sont entrés par l'utilisateur :

```
k = input('donnez une valeur pour k :')
p = input('donnez une valeur pour p :')
n = 0
c = 0
while c < k
    n = n + 1
    if - - - then c = c + 1
end
end
disp(- - -)
```

- (2) On souhaite que le script précédent affiche la valeur prise par T_k . Remplacer la ligne 7 par la suivante, dûment complétée :

```
if - - - then c = c + 1, else - - -
```

Partie 2 : calcul de l'espérance S_k .

- (1) Donner la loi de S_1 ainsi que son espérance.
 (2) Soit k un entier naturel ≥ 2 . Pour tout entier naturel $n \geq k$, on note X_{n-1} la variable aléatoire égale au nombre de piles obtenus lors des $n - 1$ premiers lancers.
 (a) Donner la loi de X_{n-1} .
 (b) Donner $S_k(\Omega)$ puis écrire l'événement $[S_k = n]$ à l'aide de la variable X_{n-1} .
 (c) En déduire que la loi de S_k est donnée par :

$$\forall n \geq k, P(S_k = n) = \binom{n-1}{k-1} p^k q^{n-k}.$$

- (3) Soit k un entier ≥ 2 . On pose $Z_1 = S_1$ et, pour tout entier $i \geq 2$, on pose $Z_i = S_i - S_{i-1}$. On admet que $(Z_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ est une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes.
 (a) Donner la loi des variables aléatoires Z_i .
 (b) Exprimer S_k à l'aide de certaines des variables Z_i .
 (c) En déduire que S_k possède une espérance et donner sa valeur.
 (4) Estimation. On suppose le paramètre p inconnu et on souhaite trouver un estimateur de p . On admet que, si une suite de variables aléatoires $(Y_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ converge en probabilité vers une variable aléatoire Y , alors pour toute fonction f continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ tel que $P(Y \in I) = 1$, la suite $(f(Y_k))_{k \in \mathbb{N}^*}$ converge en probabilité vers $f(Y)$.

- (a) Pour tout $k \geq 2$, on pose $\overline{Z}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Z_i$. Montrer que la suite $(\overline{Z}_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ converge en probabilité.

- (b) En déduire que $\frac{k}{S_k}$ est un estimateur convergent de p .

- (c) Donner sans calcul la valeur de $\sum_{j=k-1}^{+\infty} P(S_{k-1} = j)$. Montrer alors que la variable aléatoire $\frac{k-1}{S_k-1}$ possède une espérance et que l'on a : $E\left(\frac{k-1}{S_k-1}\right) = p$.

- (d) En déduire que $\frac{k}{S_k}$ est un estimateur biaisé de p (on ne cherchera pas à calculer la valeur de ce biais).

Partie 3 : calcul de l'espérance de T_k .

- (1) Comparer les variables aléatoires S_1 et T_1 .
- (2) Soit $k \geq 2$. On admet que T_k possède une espérance que l'on se propose de déterminer.
 - (a) Justifier, en utilisant la variable aléatoire W égale au rang du premier face lors de l'expérience décrite au début de ce problème, que les événements $F_1, P_1 \cap F_2, P_1 \cap P_2 \cap F_3, P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap F_4, \dots, P_1 \cap \dots \cap P_{k-1} \cap F_k$ et $P_1 \cap \dots \cap P_{k-1} \cap P_k$, forment un système complet d'événements.
 - (b) Montrer que, pour tout entier $n \geq k$, on a $P_{F_1}(T_k = n) = P(T_k = n - 1)$, puis en déduire que l'espérance conditionnelle $E(T_k|F_1)$ est égale à $1 + E(T_k)$.
 - (c) De la même façon, déterminer, pour tout $i \in \llbracket 2, k \rrbracket$, la valeur de $E(T_k|P_1 \cap \dots \cap P_{i-1} \cap F_i)$.
 - (d) Justifier que $E(T_k|P_1 \cap \dots \cap P_k) = k$.
- (3) (a) Déduire des questions précédentes la relation : $E(T_k) = \sum_{j=0}^{k-1} (j+1)p^j q + E(T_k) \sum_{j=0}^{k-1} p^j q + kp^k$.
 - (b) Etablir finalement que : $E(T_k) = \frac{1-p^k}{qp^k}$.
- (4) Justifier que $E(S_k) \leq E(T_k)$, puis utiliser certains résultats des parties 2 et 3 pour établir, sans étude de fonction, que l'on a :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \forall p \in]0, 1[, \quad (k-1)p^k \geq kp^{k-1} - 1.$$